

# SLOVAKS<sup>2</sup> NSTE-AKS

František Kovář

I. Interná klinika UN

Martin



- **Zber dát:** 2 mesiace aug + sept. 2011
- 68 pracoviísk SR (t.j. 88 % všetkých)
- **AKS:**
  - STEMI
  - NSTEMI-AKS (NAP/NSTEMI)
- ✓ Vybrané anamnestické ukazovatele
- ✓ Poskytnutá farmakologická th
- ✓ Invazívna diagnostika a následná revaskularizácia
- ✓ + TIMI rizik. skóre
- ✓ + Killip-Kimbal pri prijatí

# Porovnanie SLOVAKS a SLOVAKS<sup>2</sup>

	<b>SLOVAKS 2008</b>	<b>SLOVAKS<sup>2</sup></b>
Sledované obdobie	12M	2M
Počet hláseníek NSTE-AKS	3 047	1 080
TIMI rizikové skóre	-	+
Killip-Kimbal pri prijatí	-	+
Renálna insuficiencia	-	+


	NAP		NSTEMI		NSTE-AKS spolu	
	n	Priem. vek, r (SD)	n	Priem. vek, r (SD)	n	Priem. Vek, r, (SD)
<b>Muži</b>	334	64,2 (10,8)	348	65,0 (11,5)	682	64,6 (11,3)
<b>Ženy</b>	186	69,9 (8,9)	214	72,5 (11,7)	400	71,3 (10,5)
<b>Spolu</b>	520	66,2 (10,5)	562	67,9 (12,2)	1082	67,1 (11,4)

# NSTE-AKS: Komorbidity




# Anamnestické údaje


NAP



NSTEMI




## TIMI skóre (1)




## TIMI skóre (2)

NAP




NSTEMI






# Killip-Kimbal pri prijatí




	NAP		NSTEMI	
	N (%)	EF , %(SD)	N (%)	EF , %(SD)
<b>Muži</b>	307 (91,9)	52,2 (8,7)	313 (89,9)	49,4 (9,6)
<b>Ženy</b>	162 (87,1)	54,7 (7,8)	192 (89,7)	48,6 (9,7)
<b>Spolu</b>	469 (90,2)	53,1 (8,5)	505 (89,9)	49,1 (9,7)


## Liečba NSTEMI-AKS




# Invazívna diagnostika



## NAP




## NSTEMI



# Vybraná komorbidity: porovnanie SLOVAKS 2008 a SLOVAKS<sup>2</sup>

**SLOVAKS 2008**

**SLOVAKS<sup>2</sup>**




# Sprievodná farmakologická liečba: porovnanie SLOVAKS 2008 a SLOVAKS<sup>2</sup>

**SLOVAKS 2008**

**SLOVAKS<sup>2</sup>**


■ SLOVAKS 2008 ■ SLOVAKS<sup>2</sup>



# Indikácia SKG a PKI u NSTE-AKS: porovnanie SLOVAKS 2008 a SLOVAKS2

**SLOVAKS 2008**

**SLOVAKS<sup>2</sup>**





- ♥ Trend v zlepšení hlásenia AKS (oproti SLOVAKS 2008)
- ♥ Zlepšenie kvality hlásenky (rizik. skóre, anamnest.dáta, sprievodné ochorenia)
- ♥ Prechod na on-line zadávanie údajov do registra = pozitívny
- ♥ Výborná akceptácia odporúčaní pre kombinovanú farmakologickú liečbu (okrem GP IIb/IIIa blokátorov)
- ♥ prvé použitie alternatívnych blokátorov ADP receptorov (okrem klopidoogrelu)
- ♥ Zlepšenie indikácií na invazívnu diagnostiku a následnú revaskularizáciu