

# Nastavenie pacienta na liečbu inhibítorom SGLT2

1  
↓

**Výber vhodného pacienta s HFrEF (s DM2 alebo bez DM2), ktorý spĺňa podmienky pre liečbu inhibítorom SGLT2**

2  
↓

**Iniciácia liečby inhibítorom SGLT2**

- Vyberte SGLT2 inhibítor na základe SPC lieku

3  
↓

**Úprava súbežnej liečby SZ**

- Prerušte liečbu SZ, ktorá nie je založená na medicíne dôkazov s cieľom minimalizovať polypragmáziu
- V prípade potreby upravte dávkovanie kľúčového diuretika na základe dôkladného sledovania hmotnosti a symptómov
- Prerušte alebo redukujte liečbu iných ochorení, ktorá zhoršuje SZ /interferuje s liečbou SZ (napr. nesteroidné antireumatiká, inhibítory xantínoxidázy a pod.)

4  
↓

**Úprava súbežnej antihyperglykemickkej liečby**

- Ak u pacientov s DM2 liečba dosahuje glykemické ciele príp. je pod cieľovou hladinou, zvážte zníženie/prerušenie SU alebo inzulínu (je vhodné vyhýbať sa podávaniu TZD pri SZ)
- Zmena/titrácia inzulínu by sa mala vykonať v spolupráci s diabetológom
- Informujte diabetológa o pridaní inhibítora SGLT2 do liečby a poučte pacienta o potrebe informovania svojho ošetrojúceho diabetológa

5  
↓

**Poučenie pacienta**

- Ak je pacient chorý a má obmedzený perorálny príjem alebo je pred veľkým chirurgickým zákrokom, dočasne prerušte užívanie SGLT2i
- Identifikujte rizikové faktory predisponujúce ku ketoacidóze a ak je to možné, odstráňte ich
- Sledujte príznaky deplécie objemu a ortostatickej hypotenzie
- Informujte pacienta o potrebe primeranej intímnej hygieny a starostlivosti o nohy

6

**Dlhodobé ďalšie sledovanie**

- Pokračujte v interdisciplinárnej komunikácii
- Zabezpečte nepretržitý prístup k lieku a adherenciu

**eGFR:** odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie; **SZ:** srdcové zlyhávanie; **HFrEF:** SZ so zníženou ejekčnou frakciou (EF); **SGLT2:** sodíkovo-glukózový kotransportér 2; **SU:** sulfonylurea; **DM2:** diabetes mellitus 2. typu; **TZD:** tiazolidindióny.

Adaptované a pripravené na základe Honigberg MC a kol. Circ Heart Fail. 2020;13(2):e006623.

Informácie uvedené v tomto dokumente nemajú slúžiť ako oficiálne odporúčania pre manažment pacientov. Klinickí lekári by nemali používať žiadne postupy, lieky alebo iné diagnostické alebo liečebné postupy uvedené v tomto dokumente bez vyhodnotenia stavu svojich pacientov a možných kontraindikácií, posúdenia akýchkoľvek príslušných informácií o liekoch od výrobcu a porovnania s odporúčaniami iných orgánov.